

地理人文探究

愛滋病

徐振洋 黃禹威 涂漢隆 鄭明恩

CONTENTS

01

認識愛滋病

02

傳染途徑

03

症狀與治療

04

如何預防？

PART ONE

認識愛滋病

愛滋病的3大迷思

Q1：單一性伴侶就不會感染愛滋？

A1：安全性行為及定期愛滋篩檢才是安全的做法

Q2：感染愛滋病毒HIV就是愛滋病AIDS？

A2：當HIV感染者有發病的狀況產生才稱為愛滋病

Q3：愛滋篩檢陰性就是沒有感染愛滋？

A3：感染愛滋病毒後，有段空窗期，因此檢驗結果可能呈陰性反應。



紅絲帶的意義

HIV感染者和愛滋病患者共同生活的人要團結一致

愛滋病是什麼？

後天免疫缺乏症候群(AIDS)

是一種人類免疫缺乏病毒，感染造成的疾病。

愛滋病病毒是相當脆弱的。

他必須在活體的細胞中才得以生存，
若是離開人體的話就會失去複製的能力。




紅絲帶的意義

HIV感染者和愛滋病患者共同生活的人要團結一致

愛滋病的歷史



2018年愛滋病毒(HIV)盛行率



發現

最早出現在1920年代的非洲的剛果，由西非中部的黑猩猩傳給人類
後來由此處開始蔓延全球。

前兩大的國家皆在非洲如下

01

非洲

史瓦帝尼 27.3%

02

非洲

賴索托 23.6%

為何如此盛行？

與長期貧困與醫療資源的匱乏有著很大的關係

PART TWO

傳染途徑

傳染的途徑

01. 母子遺傳

感染愛滋病的母親可能經由懷孕，生產，哺乳傳播



02. 體、血液傳染

輸血時輸進被愛滋病污染的血液，與愛滋病毒感染者共用針具。

03. 性行為傳染

只要有正確使用保險套就大大的降低機率




傳染的途徑 2

01. 抱抱

和感染者近距離抱抱，
並不會造成感染

抱抱~



02. 聊天

聊天時有口水的接觸，
如果嘴巴沒傷口也不會
造成感染

03. 碰到血液？

碰到感染者的血液時，如果身
上沒有傷口且無接觸，則不會
造成感染



PART THREE

症狀與治療

愛滋病的症狀

感染病毒後的發展過程。

空窗期1~2個星期

有類似感冒的症狀
Ex:發燒 頭痛 喉嚨痛 疲倦

·此時病毒量非常高 傳染力強

潛伏期5~10年

基本上沒什麼症狀

發病期

免疫系統的力量極低 已無法對抗伺機性感染而發病

Ex:肺結核菌 肺囊蟲肺炎

治療

到目前為止還未有完全治癒愛滋病的方法 不過已經有降低病毒量的方法

雞尾酒療法

1. 組合至少三種抗愛滋病毒の藥物
2. 大幅降低腫瘤得機會與致死的風險
3. 不等於治癒



感染者需耐心服藥
才能控制病情喔！

PART FOUR

如何預防？

預防


01. 防護措施

要戴保險套



02. 避免多重性伴侶

避免跟一個以上的人
有性行為



03. 不共用針頭

不使用同個針頭



參考文獻

https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/tBeiXNvq_PG60N3RQAceFg

<https://www.cdc.gov.tw/Category/QAPage/fV5yD36S7dZuzHVcqFgQ-Q>

The background features a light gray gradient with several overlapping organic shapes in teal and orange. Thin, wavy lines in teal and orange also traverse the scene. The word 'THANK' is centered on a white rectangular area.

THANK